

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 10-3-77393362

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ABONNEMENT ANNUEL :

ÉDITION DE LA STATION « AUVERGNE ET LIMOUSIN »

50,00 F

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DOME, HAUTE-VIENNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Cité Administrative, rue Pelissier, 63034 Clermont-Ferrand Cedex

Téléphone 92-42-68 - Postes 440 et 449

Régie de Recettes de la D.D.A.
Sous-Régisseur de Recettes
du Service de la Protection
des Végétaux
Cité Administrative - Rue Pelissier
63034 Clermont-Ferrand Cedex
C. C. P. Clermont-Ferrand 5.503-17

BULLETIN N° 70 du 2 MARS 1977.-

ARBRES FRUITIERS

TAVELURE DU POIRIER.-

Dans certains vergers de Poiriers des attaques graves peuvent avoir lieu, dès le départ de la végétation, à partir des germes (conidies) se formant sur les pustules chancreuses de Tavelure qui se trouvent sur les rameaux.

D'autre part, les ascospores contenues dans les périthèces (forme de conservation hivernale du champignon dans les feuilles tombées à l'automne) sont arrivées à maturité.

En conséquence dans les endroits favorables à la Tavelure, il est conseillé d'effectuer un traitement fongicide, de préférence avec un produit cuprique, dès que les bourgeons floraux seront au stade C3 (voir au verso le tableau des stades-repères).

Ce stade est atteint, parfois dépassé dans certaines situations pour différentes variétés.

C O L Z A

CHARANÇON DE LA TIGE.-

L'insecte est apparu en différents endroits dès le 16 Février mais, jusqu'alors, les sorties n'ont pas encore été, dans l'ensemble, très importantes.

Avec le retour du beau temps (relèvement des températures) l'activité de ce ravageur va s'accroître et, dans les cultures où des attaques sont à redouter (1), il y aura lieu d'effectuer un traitement (pour les produits à utiliser, consulter la revue PHYTOMA de Février 1977).

Il est rappelé que contre cet insecte, dont les attaques sont possibles à partir du stade "début montaison", il n'y a plus lieu d'intervenir lorsque la tige florale atteint une vingtaine de centimètres de longueur.

- (1) - Dans la mesure du possible, s'assurer de la présence de l'insecte soit par piégeage (panneau englué ou, de préférence, cuvette jaune) soit par observation directe dans la culture.

LISTE DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES HOMOLOGUES OU EN AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE AU 1er JANVIER 1977 et DELAIS D'EMPLOI

Ces renseignements figurent dans le numéro 285 de Février 1977 de la revue PHYTOMA. Les abonnés ne bénéficiant pas du Service de cette revue (abonnements collectifs) recevront prochainement les tirés à part de ces documents.

Clermont-Ferrand, le 2 Mars 1977.

Le Chef de la Circonscription
Phytophitaire,

A. LECLERC.

N° d'inscription à la C.P.P.A.P. : 525 AD.

DÉVELOPPEMENT DES ORGANES DE FRUCTIFICATION DES ARBRES FRUITIERS TABLEAU N° 1 — STADES-REPÈRES DU POIRIER

